


CARTA DEGLI HABITAT IN BASE  
ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

FOGLIO 2  
ZPS VALLE RAPEGNA E  
MONTE CARDOSA IT53330008  
(DIRETTIVA 92/43/CEE)

| COORDINATE VERTICI |         |         |
|--------------------|---------|---------|
| VERTICI            | N       | E       |
| NO                 | 4751206 | 2368259 |
| NE                 | 4751206 | 2372261 |
| SO                 | 4743278 | 2368259 |
| SE                 | 4743278 | 2372261 |

QUADRO D'UNIONE  
SEZIONI 1:10000



--- Confine ZPS proposto  
--- Confine ZPS vigente

LEGENDA  
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 2368 Ha  
AREA COPERTA DA HABITAT 1911 Ha

- 6220\* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea  
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:  
6 - Prateria a forasacco e cinquantaglia di Tommasini  
Ass. *Potentillo cinerasc-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004  
subass. *potentillietosum cinerasc* Biondi et al. 2004  
Superficie stimata dell'habitat 5 Ha (0,3%)
- 6210\* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo  
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
1 - Pascolo xerico ad astragalo spinoso e sesleria dei macereti  
Ass. *Astragalus sempervirens-Seslerietum nitidae* Biondi & Ballesi 1995  
4 - Prateria a forasacco comune e soraglini comuni e festuca dei nardeti  
Ass. *Briza media-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Coverelli corr. Biondi & Ballesi 1982  
subass. *restuotetum communis* Catocci, Gatti & Ballesi 2005  
5 - Prateria aperta a sesleria dei macereti  
Ass. *Polygala majoris-Seslerietum nitidae* Biondi, Ballesi, Allegrezza & Zuccarello 1995  
6 - Prateria a forasacco e cinquantaglia di Tommasini  
Ass. *Potentillo cinerasc-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004  
subass. *potentillietosum cinerasc* Biondi et al. 2004  
Superficie stimata dell'habitat 589 Ha (30,8%)
- 9210\* Faggeti dell'Appennino con *Taxus* ed *Ilex*  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
2 - Bosco termofilo, neutro-basifilo di faggio  
Ass. *Lathyrus veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002  
subass. *lathyrinetosum veneti* Biondi et al. 2002  
3 - Bosco microtermo, basifilo di faggio  
Ass. *Cardamine kitalbii-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995  
Superficie stimata dell'habitat 1108 Ha (58%)
- 4080 Boscarelle subartiche di *Salix* spp.  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
8 - Cespuglieto alto a ranno alpino  
Ass. *Rhamnus alpinus-Amelanchieretum ovale* Pedrotti 1994  
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine  
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:  
7 - Prateria discontinua a sesleria dell'Appennino  
Ass. *Seslerietum apenninae* Miglaccio 1970 em. Bonin 1978  
9 - Pascolo a ranuncolo del Pollino e fenarola violacea  
Ass. *Semecio scopoli-Ranunculetum pollinense* Biondi & Ballesi 1995  
subass. *plantaginietosum atratae*  
Superficie stimata dell'habitat 209 Ha (10,9%)

--- Confine ZPS proposto  
--- Confine ZPS vigente

