


CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

FOGLIO 2

**SIC VALLE RAPEGNA E MONTE CARDOSA
IT53330008 (AB63)
(DIRETTIVA 92/43/CEE)**

COORDINATE VERTICI CAUSSO-BOAGA FUSO EST			
VERTICI	N	E	
NO	4748368	2366861	
NE	4748368	2372881	
SO	4742104	2366861	
SE	4742104	2372881	

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



Confine SIC proposto (blue dashed line)
Confine SIC vigente (red solid line)

**LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE**

AREA CARTOGRAFATA 2368 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 1911 Ha

- 6220* Percorsi substepici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentillo cinereae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillotum cinereae* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 5 Ha (0,3%)
- 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Pascolo varco ad astragalto spinoso e sesteria dei macerelli
Ass. *Astragalus sempervivens-Seslerium nitidum* Biondi & Ballelli 1995
4 - Prateria a forasacco comune e sonaglii comuni e festuca dei nardelli
Ass. *Bromo mediae-Brometum erecti* Biondi & Covarelli corr. Biondi & Ballelli 1982
subass. *festucetosum commutatae* Calorci, Gatti & Ballelli 2006
5 - Prateria aperta a sesteria dei macerelli
Ass. *Polygala majora-Seslerium nitidum* Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarelli 1995
6 - Prateria a forasacco e cinquefoglia di Tommasini
Ass. *Potentillo cinereae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi & Gubellini 2004
subass. *potentillotum cinereae* Biondi et al. 2004
Superficie stimata dell'habitat 589 Ha (30,8%)
- 9210* Faggeti dell'Appennino con *Taxus* ed *Ilex*
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Bosco termofilo, neutro-basilfo di faggio
Ass. *Lathyrus veneti-Fagelum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi et al. 2002
3 - Bosco microtermo, basilfo di faggio
Ass. *Castanetum strobiliferae-Fagelum sylvaticae* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 1108 Ha (58%)
- 4080 Boscaglie subartiche di *Salix* spp.
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Cespuglieto alto a ramo alpino
Ass. *Rhamnus alpinae-Amentanchetum ovale* Pedrotti 1994
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)
- 6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Prateria discontinua a sesteria dell'Appennino
Ass. *Seslerium apenninae* Migliaccio 1970 em. Borin 1978
9 - Pascolo a ranuncolo del Pollino e fenarola violacea
Ass. *Senecio scopoli-Ranunculetum pollinensis* Biondi & Ballelli 1995
subass. *planiagrostetosum alpinae*
Superficie stimata dell'habitat 209 Ha (10,9%)

Confine SIC proposto (blue dashed line)
Confine SIC vigente (red solid line)

