UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AMBIENTALI E DELLE PRODUZIONI VEGETALI

GIUNTA REGIONE MARCHE
ASSESSORATO AMBIENTE

POSIZIONE DI FUNZIONE
BIODIVERSITA' E RETE ECOLOGICA REGIONALE

Progetto di rete ecologica della Regione Marche (R.E.M.)

Coordinatore Prof. Edoardo Biondi

CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE

SIC MONTE NERONE GOLA DI GORGO A CERBARA IT5310017 (AB18) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

SCALA 1:10.000

0 125 250 500
Metri

SISTEMA DI RIFERIMENTO: GAUSS-BOAGA (ROMA 1940) FUSO EST

AUTORI:
BIONDI Edoardo
ANGELINI Elia
CASAVECCHIA Simona
PESARESI Simone
VENTRONE Fulvio

Rilevamenti cartografici eseguiti negli anni: 2005-2006

COORDINATE VERTICI		
	GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4831942	2313359
NE	4831942	2321729
SO	4821236	2313359
SE	4821236	2321729

LEGENDA HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 8246 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 2795 Ha

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
Superficie stimata dell'habitat 355 Ha (12,7%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Prateria a forasacco e stellina purpurea
Ass. *Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995
10 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
11 - Prateria con sesleria dei macereti e forasacco
Ass. *Sesleric nitidae-Brometum erecti* Bruno in Bruno & Covarelli 1968
Superficie stimata dell'habitat 1277 Ha (45,7%)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Bosco di roverella con citiso a foglie sessili
Ass. *Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis* Blasi, Feoli & Avena 1982
Superficie stimata dell'habitat 388 Ha (13,9%)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco ripariale a rovo e salice bianco
Ass. *Rubo ulmifolii-Salicetum albae* Allegrezza, Biondi & Felici 2006
Superficie stimata dell'habitat 22 Ha (0,8%)

9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Bosco termofilo, neutro-basifilo di faggio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi et al. 2002
Superficie stimata dell'habitat 569 Ha (20,4%)

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Arbusteto di ginestra e citiso a foglie sessili con abbondante ginepro comune
Ass. *Spartio junce-Cytisetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza & Guitian 1988
var. a *Juniperus communis ssp. communis*
Superficie stimata dell'habitat 16 Ha (0,6%)

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
13 - Popolamento casmofitico a sassifraga callosa
Ass. *Saxifrago australis-Trisetetum bertoloni* Biondi & Ballelli 1982
Superficie stimata dell'habitat 38 Ha (1,4%)

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco
Aggr. a *Populus nigra o Populus alba o Salix alba*
12 - Bosco ripariale a pioppo nero
Ass. *Salici albae-Populetum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
subass. *populetosum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936
Superficie stimata dell'habitat 8 Ha (0,3%)

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
5 - Bosco di leccio
Ass. *Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis* Biondi & Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignattelli & Venanzoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi, Casavecchia & Gigante 2003
Superficie stimata dell'habitat 69 Ha (2,5%)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco di cerro
Ass. *Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi & Speranza 1982
subass. *aceretosum obtusati* Ubaldi & Speranza 1982
7 - Bosco di cerro con carpino bianco
Ass. *Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi & Speranza 1982
subass. *pyretosum* Biondi et al. 1988
Superficie stimata dell'habitat 53 Ha (1,9%)

Confine SIC vigente
Confine SIC proposto

FOGLIO 1

QUADRO D'UNIONE SEZIONI 1:10000

Allestimento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): Simone Pesaresi

Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

ANCONA, 02/02/2009

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE, opportunamente rielaborata