CARTA DEGLI HABITAT IN BASE ALLA DIRETTIVA 92/43/CEE
ZPS MONTE CARPEGNA E SASSO SIMONE E SIMONCELLO
IT5310026 (ZPS06) (DIRETTIVA 92/43/CEE)

FOGLIO 2

QUADRO D'UNIONE
SEZIONI 1:10000



COORDINATE VERTICI		
	GAUSS-BOAGA FUSO EST	
VERTICI	N	E
NO	4858336	2295828
NE	4858336	2312794
SO	4844508	2295828
SE	4844508	2312794

LEGENDA
HABITAT 92/43/CEE

AREA CARTOGRAFATA 7807 Ha
AREA COPERTA DA HABITAT 3565 Ha

6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi
si rinviene nelle radure delle seguenti tipologie vegetazionali:
15 - Prateria discontinua a sesleria italiana
Ass. *Valeriano montanae-Seslerietum italicae* Ubaldi 1974
Superficie stimata dell'habitat 11 Ha (0,3%)

6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di Orchidee)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
11 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
12 - Prateria a forasacco comune e fiordaliso bratteato con falasco
Ass. *Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian & Taffetani 1986
var. a Brachypodium rupestre
13 - Prateria a forasacco e ononide di masquillieri
Ass. *Ononido masquillieri-Brometum erecti* Biondi et al. 1988
15 - Prateria discontinua a sesleria italiana
Ass. *Valeriano montanae-Seslerietum italicae* Ubaldi 1974
Superficie stimata dell'habitat 1013 Ha (28,4%)

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
8 - Bosco di frassino maggiore
Ass. *Fraxino excelsioris-Aceretum obtusati* Ubaldi & Speranza ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 18 Ha (0,5%)

91AA* Boschi orientali di quercia bianca
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
7 - Bosco di roverella
Ass. *Peucedano cervariae-Quercetum pubescentis* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
subass. *peucedanetosum cervariae* (Ubaldi, Puppi, Speranza & Zanotti. 1984) Ubaldi 1988
Superficie stimata dell'habitat 373 Ha (10,5%)

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
1 - Formazioni a pioppo tremolo e pioppo bianco
Aggr. a Populus tremula e Populus alba
Superficie stimata dell'habitat 44 Ha (1,2%)

9210* Faggeti dell'Appennino con Taxus ed Ilex
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
4 - Bosco termofilo, neutro-basifilo di faggio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi et al. 2002
5 - Bosco termofilo, neutro-basifilo di faggio con tiglio
Ass. *Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza & Baldoni 2002
subass. *lathyretosum veneti* Biondi et al. 2002
var. a tilia platyphyllos
Superficie stimata dell'habitat 453 Ha (12,7%)

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
3 - Arbusteto di ginestra e citiso a foglie sessili con abbondante ginepro comune
Ass. *Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza & Guitian 1988
var. a Juniperus communis ssp. communis
14 - Arbusteto di prugnolo spinoso e rosa cavallina a prevalenza di rosa selvatica comune con ginepro comune
Ass. *Roso arvensis-Prunetum spinosae* Biondi & Casavecchia 2002
subass. *rosetosum caninae* Biondi & Casavecchia 2002
var. a Juniperus communis
Superficie stimata dell'habitat 353 Ha (9,9%)

91LO Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
9 - Bosco di cerro e carpino bianco
Ass. *Centaureo montanae-Carpinetum betuli* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995
Superficie stimata dell'habitat 1039 Ha (29,1%)

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
2 - Vegetazione boschiva ripariale a mosaico con pioppo nero, pioppo bianco e salice bianco
Aggr. a Populus nigra o Populus alba o Salix alba
Superficie stimata dell'habitat 66 Ha (1,9%)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile
comprende le seguenti tipologie vegetazionali:
6 - Bosco di cerro
Ass. *Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi & Speranza 1982
subass. *aceretosum obtusati* Ubaldi & Speranza 1982
Superficie stimata dell'habitat 195 Ha (5,5%)

HABITAT DISPOSTI A MOSAICO
10 - Mosaico di vegetazione dei laghetti e delle pozze temporanee
si rinvengono i seguenti habitat:
3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
comprendente le seguenti tipologie vegetazionali:
Vegetazione a Chara viridis
Aggr. a Chara viridis
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)
3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion
comprendente le seguenti tipologie vegetazionali:
Vegetazione a ranuncolo a foglie capillari
Aggr. a Ranunculus trichophyllus
Vegetazione a brasca nodosa
Aggr. a Potamogeton nodosus
Vegetazione idrofitica sommersa a zannichellia
Ass. *Zannichellietum palustris* (Baumann 1911) G. Lang 1967
Superficie stimata dell'habitat 0 Ha (0%)

Confine ZPS vigente

Confine ZPS proposto

Allestimento cartografico ed elaborazioni GIS (software: ESRI ArcGis 9.0): Simone Pesaresi

Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

Base topografica derivata da CTR 1:10000 Regione MARCHE, opportunamente rielaborata

STAMPA: Dipartimento Scienze Ambientali e Produzioni Vegetali
Facoltà di Agraria
Università Politecnica delle Marche

ANCONA, 28/01/2009